



## 形似、音似藥品管理辦法

修訂日期 1010827

1. 目的：為增進藥品外形或藥名類似藥品之有效管理，預防調劑錯誤與藥物疏失發生，確保病人用藥安全，制定本辦法。
2. 適用範圍：針對本院形似音似藥品提供管理辦法，供臨床各科部使用藥品之依循。
3. 定義：
  - 3.1. 形似藥品：藥品外觀、包裝，二種以上劑量、劑型等藥名相似易混淆之藥品。
  - 3.2. 音似藥品：藥品名稱、發音相似易混淆之藥品。
4. 相關文件：無。
5. 作業說明：
  - 5.1 藥品外形或發音類似藥品之品項維護與存放管理：
    - 5.1.1 新藥建檔：
      - 5.1.1.1 建檔藥師檢視藥品，若發現該新藥與本院已備藥品外形或藥名相似時，應於新藥上線時告知全體藥師注意，並備妥照片供藥師傳閱公告，並將此資料加入藥品外觀或藥名類似之藥品清單中。
      - 5.1.1.2 建檔時儘量避免造成新、舊藥名混淆：
        - A. 將中文藥名置於英文商品名前面。



B. 字母不同之處以大寫呈現。

C. 劑型有兩種：將非口服的劑型建於藥名前面。


D. 劑量有兩種：將少用劑量置於藥名前面。


5.1.2 因藥品外形、發音相似，造成調劑錯誤或藥物疏失時，立即修改建檔模式，加強注意避免類似事件再度發生。

5.1.3 藥師於調劑或複核藥品時，若發現藥品外形或藥名相似，應告訴主任處理。

5.1.4 藥師於複核時，發現調劑錯誤應於「門診處方調劑錯誤登記表」，登錄正確藥品及調劑錯誤藥品，調劑品管藥師每月統計分析資料，於部門會議提報修改建議。

5.1.5 藥品外形或藥名類似之藥品應分開存放，以特殊標籤明顯標示警語，特別提醒藥師調劑時注意。

5.1.5.1 藥品『發音』相似：以圖形標籤  提請藥師、護理同仁注意。

5.1.5.2 藥品『外形』相似：以圖形標籤  提請藥師、護理同仁注意。

5.2 藥品外形或藥名類似藥品處方調劑、給藥：

5.2.1 藥師調劑此類藥品時應特別謹慎。

5.2.2 調劑過程中，自「調劑台取出藥品時」、「調劑時」、「發藥前」要三讀藥品標籤，並注意「病人對」、「藥物對」、「劑量對」、「時間對」、「途徑對」



五對。

5.2.3 確實做好雙重核對措施，以避免發生給藥疏失。

5.2.4 護理人員給予住院病人藥品時，亦應落實三讀五對。

5.3 藥品外形或藥名類似之用藥教育：

5.3.1 於本院藥劑部網頁建立藥品外形及藥名類似之藥品資訊及照片，並由專責藥師定期維護，方便醫療人員隨時查閱學習，以增進病人用藥安全。

5.3.2 不定期提供護理人員有關藥品外形或藥名類似藥品之相關資訊及教育，以加強護理人員對此類藥物之認識，增進病人用藥安全。

5.3.3 由專責藥師定期提供有關藥品外形或藥名類似藥品項目之資訊、調劑錯誤與藥物疏失之案例研討、處方藥物疏失防範之宣導等，加強藥事人員對此類藥物之認知，養成注重病人用藥安全的組織文化。

5.4 藥品外形或藥名類似調劑疏失之檢討改進：

5.4.1 於每月藥劑部部門會議檢討藥品調劑疏失原因，並研擬預防改進之措施，以達到處方調劑零疏失之安全目標。

5.4.2 每年至少一次檢討藥品外觀、包裝、標示或藥名類似藥品清單，採取措施避免發生錯誤，並提供此藥品清單給藥事委員會，以為進藥或刪除藥品參考。

6. 應用表單：門診調劑錯誤登記表。

7. 流程圖：無。



藥名相似藥品(1010629)：

藥品名	藥品名
「鐵達寧嚼錠」 Tedalin(La Ferrum)	Telin(Theophylline)
Ergoton	Ergometrine 「婦科」
Isormol	Isobide
「管四」 Lexotan	Lexapro
Lonine	Loniten
Sancin	(排)暢力 Sanyl
Doxynin	Oxyban



外觀相似藥品(1010629)：

藥品名	藥品名	相似處
Trileptal	Tegretol CR	裸錠顏色相近
Qui	Dexicone	裸錠顏色大小相同
Bentyl	Bropin	裸錠顏色大小相同
Tamedin	Promperan	針劑外觀相似
Sultam	Furoxime	針劑外觀相似(皆是綠蓋)



衛生署評鑑  
優等醫院

員榮醫院

尊重生命 全人醫療

YUAN RUNG HOSPITAL



員榮醫院藥劑部關心您