



「全民健康保險藥品給付規定」修正規定

第 1 章 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system

(自 100 年 8 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
<p>1.3.2.6 <u>Carbamazepine (100/8/1)</u></p> <p><u>1. 使用於新病患：</u></p> <p><u>(1) 處方使用 carbamazepine 成分藥品之前，應先檢查病患 IC 健保卡是否已註記曾檢測帶有 HLA-B 1502 基因，檢測結果為陽性者，不得開立 carbamazepine 成分藥品之處方。</u></p> <p><u>(2) 醫師欲為病患處方 carbamazepine 成分藥品前，應先詢問病患是否對該藥品有過敏病史，若為不確認者或未檢測者，宜先行作 HLA-B 1502 基因檢測。</u></p> <p><u>2. 使用於舊病患：</u></p> <p><u>若病患已服用 4 個月以上，且確認未曾出現喉嚨痛、嘴巴破或皮膚症狀(如分散的斑點或斑丘疹症狀)等類似 Steven-Johnson 症候群或其他不良反應時，可依病情繼續處方治療，但仍需提醒病患注意上述症狀之發生。</u></p> <p><u>3. 醫師為病患處方使用 carbamazepine 成分藥品，以日劑藥費申報者，應依規定詳實申報處方明細。</u></p>	<p>無</p>

備註：劃線部份為新修訂之規定。



含 carbamazepine 成分藥品之「病人用藥須知 (medication guide)」

親愛的病友您好

為了使用提升 carbamazepine 病人之用藥安全及品質，依照衛生署食品藥物管理局規範，特別提醒您下列注意事項：

開始使用 carbamazepine 之前的注意事項：

您須要經過醫師詳細的評估後，才可以使用 carbamazepine；開始服用前請先詳細閱讀用藥須知。本用藥須知並不能取代醫療專業人員對您的病情或治療所提出的專業諮詢與建議。

carbamazepine 是甚麼藥品？可以治療哪些疾病？

carbamazepine 是一種處方藥，用來治療某些類型的癲癇發作與三叉神經痛。衛生署目前核准的適應症為癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患、原發性舌咽神經痛。

carbamazepine 非一般止痛劑，不能用於治療包括末梢神經痛之一般性疼痛。

如果您有發生過下列情況，不應使用 carbamazepine，在看診時請務必告訴醫師：

- 您對於 carbamazepine 成分曾發生過敏反應；
- 您有心臟房室阻斷問題；
- 您曾經罹患嚴重的血液疾病而致骨髓機能降低；
- 您的身體有製造卟啉 (porphyrin) 的問題 (又名肝性紫斑沈著症)，卟啉是一種對於肝功能和血液形成相當重要的色素；
- 您對於三環抗憂鬱劑 (tricyclic antidepressants; TCAs) 過敏，如您無法確定包括哪些藥品，請向醫療專業人員諮詢；
- 您正在服用單胺氧化酶抑制劑 (MAO 阻斷劑) 的抗憂鬱劑時，如您無法確定包括哪些藥品，請向醫療專業人員諮詢。

您應該先告知醫師您的情況，才服用 carbamazepine：

- 您有或曾有過自殺的想法或行動，抑鬱或情緒問題；
- 您有血液疾病 (包括那些由其它藥物所造成的病症)；
- 您對於 carbamazepine 或其他藥物曾經發生異常的過敏性 (出疹或其他過敏徵兆)；
- 您從前有心臟、肝臟或腎臟疾病；
- 您的眼壓過高 (青光眼)；
- 您還患有某些特殊的精神疾病，伴隨意識不清或激躁；
- 您還在服用口服避孕藥，carbamazepine 會破壞避孕藥的功能，因此服用 carbamazepine 時，需採取其他不同的避孕方法，以避免無預期的懷孕。一旦發生不規則的子宮出血，請告訴醫師；
- 您已知懷孕或計劃懷孕，carbamazepine 可能會損害您未出生的嬰兒。若您在服用 carbamazepine 時，發現已經懷孕了，請立即告訴您的醫護人員。您和您的醫護人員應決定懷孕後是否應繼續服用 carbamazepine。
- 您在哺乳或計畫哺乳，carbamazepine 會進入母乳。您和您的醫護人員應討論是否應服用 carbamazepine 或餵奶，兩者不能併行。
- 您正在服用的藥物，包括處方藥和非處方藥，維生素、中草藥、健康食品，併用 carbamazepine 與某些其他藥物可能會引起副作用或影響它們的藥效。請諮詢您的醫師，再決定繼續服用或停用。



如果您已服用 carbamazepine，在向醫療人員諮詢前，請勿自行停止服用 carbamazepine；突然停止服藥可能導致嚴重的反應。

carbamazepine 可能引起嚴重的副作用，例如：

- ✓ 黃疸
- ✓ 腹痛
- ✓ 出血
- ✓ 喉嚨疼痛伴隨發燒情形，
- ✓ 不適
- ✓ 水泡
- ✓ 黏膜糜爛
- ✓ 嘴巴破
- ✓ 廣泛性表皮脫落
- ✓ 眼睛癢
- ✓ 皮膚紅疹等。

如果發生以上的副作用，請立刻求治並回診告訴您的醫師或藥師，或是確定有其他人可以幫助您與您的醫師或藥師聯絡。

因為它們可能是血液、肝臟、腎臟或其它器官發生嚴重傷害的早期徵兆，可能需要緊急的醫療處理。