



衛生署評鑑
優等醫院

員榮醫院

尊重生命 全人醫療

YUAN RUNG HOSPITAL



降尿酸劑 (Allopurinol) 藥物指導

編號： YR-ND-N-0302

藥品名稱	成分
<input type="checkbox"/> Synoride 欣律	<input type="checkbox"/> Allopurinol 100mg
<input type="checkbox"/> Clint 克利特錠	<input type="checkbox"/> Allopurinol 100mg
<input type="checkbox"/> Allopurinol 安樂普諾錠	<input type="checkbox"/> Allopurinol 100mg
<input type="checkbox"/> 其他：_____	

◎注意事項：

1. 有下列情況應告知醫師：曾經對此類藥物有過敏反應者、已懷孕或打算要懷孕或正在哺乳的婦女、肝腎功能不佳或有其他疾病(糖尿病、高血壓、心臟衰竭、癲癇發作、癌症等)。
2. 除限水患者(如:心臟衰竭)外，服用此藥期間請多喝水(至少 2000-3000c.c.)，以幫助尿酸的排除。
3. 除非醫生指示否則不要隨便改變劑量。使用初期可能使痛風症狀惡化，因此不用於急性痛風的發作。
4. 酒精及高普林飲食(如:沙丁魚、內臟、豆類等)會加重或引發痛風的發作，應儘量避免。
5. 不可大量服用維他命 C，因大量的維他命 C 會使尿液酸化，使得腎臟結石易形成。
6. 如有下列副作用發生請通知醫生：昏昏欲睡、頭痛、噁心嘔吐或腹瀉、皮膚發疹發癢、疼痛或脫皮；發燒、冷顫或喉嚨痛；排尿疼痛、血尿；皮膚或眼睛變黃；呼吸困難。昏昏欲睡、頭痛、噁心嘔吐或腹瀉，可能於服藥一陣子之後會改善。可於飯後使用以減少胃腸不適，但若持續胃腸不適須回診。

員榮醫院關心您！

請交病人參閱

降尿酸劑 (Allopurinol) 藥物指導

請黏貼於病歷

◎注意事項：

1. 有下列情況應告知醫師：曾經對此類藥物有過敏反應者、已懷孕或打算要懷孕或正在哺乳的婦女、肝腎功能不佳或有其他疾病(糖尿病、高血壓、心臟衰竭、癲癇發作、癌症等)。
2. 除限水患者(如:心臟衰竭)外，服用此藥期間請多喝水(至少 2000-3000c.c.)，以幫助尿酸的排除。
3. 除非醫生指示否則不要隨便改變劑量。使用初期可能使痛風症狀惡化，因此不用於急性痛風的發作。
4. 酒精及高普林飲食(如:沙丁魚、內臟、豆類等)會加重或引發痛風的發作，應儘量避免。
5. 不可大量服用維他命 C，因大量的維他命 C 會使尿液酸化，使得腎臟結石易形成。
6. 如有下列副作用發生請通知醫生：昏昏欲睡、頭痛、噁心嘔吐或腹瀉、皮膚發疹發癢、疼痛或脫皮；發燒、冷顫或喉嚨痛；排尿疼痛、血尿；皮膚或眼睛變黃；呼吸困難。昏昏欲睡、頭痛、噁心嘔吐或腹瀉，可能於服藥一陣子之後會改善。可於飯後使用以減少胃腸不適，但若持續胃腸不適須回診。

日期/指導者	病人/家屬 簽名	成效評值	日期/評值者	再次評值	日期/評值者

成效評值：1.瞭解 2.部份瞭解 3.不瞭解 (部份瞭解/不瞭解 請再次評值)

