



衛生署評鑑
優等醫院

員榮醫院

尊重生命 全人醫療

YUAN RUNG HOSPITAL



降尿酸劑 (Colchicine 秋水仙鹼) 藥物指導

編號： YR-ND-N-0303

藥品名稱	作用
<input type="checkbox"/> Colchicin	減少白血球移向發炎關節，減少關節尿酸結晶及乳酸的生成，進而減輕關節發炎反應。治療及預防痛風發作，預防重覆發作。
<input type="checkbox"/> 其他： _____	

◎注意事項：

1. 懷孕或曾有胃、腸潰瘍、肝、腎功能異常者請事先告知醫生。
2. 依醫生指示用量與用法服用；一般急性發作期，建議用法用量為一顆口服，每 1-2 小時一次。
3. 每日最大劑量 16 顆 (8 毫克) 須停藥三天後才可繼續使用。預防性使用一般為每天一次，每次一顆。
4. 請於痛風發作預感出現時開始服用，或痛風第一次發作即開始服用。
5. 如非必要不宜長期使用，可能會有血液、肝、腎障害，可能的副作用：噁心、嘔吐、腹部疼痛、下痢。
6. 服藥期間若有發疹、癢、發燒、喉嚨痛、胃痛、胃灼熱、黑便、血尿、尿量減少等現象請速回診檢查。
7. 可配合適當的輔助療法 (如飲食控制、減輕體重、增加液體的攝取、減少酒精飲料的飲用)，以減少痛風發作。

請交病人參閱

員榮醫院關心您！

降尿酸劑 (Colchicine 秋水仙鹼) 藥物指導

作用：減少白血球移向發炎關節，減少關節尿酸結晶及乳酸的生成，進而減輕關節發炎反應。

請黏貼於病歷

注意事項：

1. 懷孕或曾有胃、腸潰瘍、肝、腎功能異常者請事先告知醫生。
2. 依醫生指示用量與用法服用；一般急性發作期，建議用法用量為一顆口服，每 1-2 小時一次。
3. 每日最大劑量 16 顆 (8 毫克) 須停藥三天後才可繼續使用。預防性使用一般為每天一次，每次一顆。
4. 請於痛風發作預感出現時開始服用，或痛風第一次發作即開始服用。
5. 如非必要不宜長期使用，可能會有血液、肝、腎障害，可能的副作用：噁心、嘔吐、腹部疼痛、下痢。
6. 服藥期間若有發疹、癢、發燒、喉嚨痛、胃痛、胃灼熱、黑便、血尿、尿量減少等現象請速回診檢查。
7. 可配合適當的輔助療法 (如飲食控制、減輕體重、增加液體的攝取、減少酒精飲料的飲用)，以減少痛風發作。

日期/指導者	病人/家屬 簽名	成效評估	日期/評值者	再次評估	日期/評值者

成效評估：1.瞭解 2.部份瞭解 3.不瞭解 (部份瞭解/不瞭解 請再次評估)

編號： YR-ND-N-0303