



衛生署評鑑  
優等醫院

員榮醫院

尊重生命 全人醫療

YUAN RUNG HOSPITAL



## 類固醇藥物指導

編號：YR-ND-N-0304

用法	藥品名稱	作用
口服	<input type="checkbox"/> Excelin <input type="checkbox"/> Preconin <input type="checkbox"/> 其它_____	抗發炎及免疫抑制作用
針劑	<input type="checkbox"/> Belon <input type="checkbox"/> Methasone <input type="checkbox"/> Medesone <input type="checkbox"/> Kenacort-A <input type="checkbox"/> solu-medrol <input type="checkbox"/> Rinderon <input type="checkbox"/> 其它_____	抗發炎
外用	<input type="checkbox"/> CHU-FU <input type="checkbox"/> Rinderon-V <input type="checkbox"/> 其它_____	抗發炎、抗過敏

### ◎注意事項：

- 1.若有過敏或嚴重不良反應、骨骼疾病、感染症發生、要施打疫苗，請告知醫師。此要會對小孩子生長抑制，請遵照醫師處方，不可自行調整。
- 2.若有胃腸不適，可飯後服藥，告知醫生，並避免飲用含酒精飲料。
- 3.主要副作用會引起浮腫，血壓上升，請腎臟及高血壓疾病患者注意，糖尿病患者，注意有無增加 Insulin 藥量必要。
- 4.請配合低鹽、低鈉、高鉀的食物（香蕉、海帶、含葉蔬菜等）飲食，多補充鈣質及維生素 D，多攝取蛋白質，不可有太多熱量，預防體重過重。避免過多使用甘草，因會加強低血鉀現象。
- 5.若忘記服藥，請依下列方法補救：隔日一次：若忘記服藥，應儘快補服，若隔日才想起，亦儘快補服，給藥間隔則順延一天。每天一至數次：立即補服，如果已經接近下次服藥時間，可跳過不服，不必服用雙倍量。
- 6.高劑量服用時，應注意精神抑鬱及其他精神狀況。

員榮醫院關心您！

請交病人參閱

請黏貼於病歷

### 類固醇藥物指導

用法	藥品名稱	作用
口服	<input type="checkbox"/> Excelin <input type="checkbox"/> Preconin <input type="checkbox"/> 其它_____	抗發炎及免疫抑制作用
針劑	<input type="checkbox"/> Belon <input type="checkbox"/> Methasone <input type="checkbox"/> Medesone <input type="checkbox"/> Kenacort-A <input type="checkbox"/> solu-medrol <input type="checkbox"/> Rinderon <input type="checkbox"/> 其它_____	抗發炎
外用	<input type="checkbox"/> CHU-FU <input type="checkbox"/> Rinderon-V <input type="checkbox"/> 其它_____	抗發炎、抗過敏

◎**注意事項**：1.若有過敏或嚴重不良反應、骨骼疾病、感染症發生、要施打疫苗，請告知醫師。此要會對小孩子生長抑制，請遵照醫師處方，不可自行調整。2.若有胃腸不適，可飯後服藥，告知醫生，並避免飲用含酒精飲料。3.主要副作用會引起浮腫，血壓上升，請腎臟及高血壓疾病患者注意，糖尿病患者，注意有無增加 Insulin 藥量必要。4.請配合低鹽、低鈉、高鉀的食物（香蕉、海帶、含葉蔬菜等）飲食，多補充鈣質及維生素 D，多攝取蛋白質，不可有太多熱量，預防體重過重。避免過多使用甘草，因會加強低血鉀現象。5.若忘記服藥，請依下列方法補救：隔日一次：若忘記服藥，應儘快補服，若隔日才想起，亦儘快補服，給藥間隔則順延一天。每天一至數次：立即補服，如果已經接近下次服藥時間，可跳過不服，不必服用雙倍量。6.高劑量服用時，應注意精神抑鬱及其他精神狀況。

日期/指導者	病人/家屬 簽名	成效評值	日期/評值者	再次評值	日期/評值者

成效評值：1.瞭解 2.部份瞭解 3.不瞭解 (部份瞭解/不瞭解 請再次評值)

編號：YR-ND-N-0304