



衛生署評鑑
優等醫院

員榮醫院

尊重生命 全人醫療

YUAN RUNG HOSPITAL



口服降血糖藥物指導

編號： YR-ND-N-0308

藥品名稱	作用
<input type="checkbox"/> Diamicron <input type="checkbox"/> Glipzide <input type="checkbox"/> 其他_____	此類藥用於治療非胰島素依賴型或成人型或第二型糖尿病，它可增加胰島素受體的敏感度，進而降低血糖。
<input type="checkbox"/> Glucomine F.C. <input type="checkbox"/> 其他_____	此類藥用於治療非胰島素依賴型或成人型或第二型糖尿病，它可降低肝醣合成、降低腸道糖分的吸收及提高胰島素的感受性，而產生降低血糖的作用。
<input type="checkbox"/> NovoNorm <input type="checkbox"/> Starlix <input type="checkbox"/> 其他_____	治療非胰島素依賴型或成人型或第二型糖尿病，它可刺激胰臟分泌胰島素，而降低血糖。
<input type="checkbox"/> glucobay <input type="checkbox"/> 其他_____	抑制碳水化合物再腸道吸收，延遲胃排空、抑制食慾，促進β細胞隊葡萄糖的敏感性而改善胰島素的釋放，改善飯後血糖
<input type="checkbox"/> Actos <input type="checkbox"/> Avandia F.C <input type="checkbox"/> 其他_____	強胰島素周邊及肝臟作用，使用時應注意 GOT、GPT 指數，上升道正常值 2.5 倍時應停用

員榮醫院關心您！

口服降血糖藥物指導

請交病人參閱
明學知公明証

藥品名稱	作用
<input type="checkbox"/> Diamicron <input type="checkbox"/> Glipzide <input type="checkbox"/> 其他_____	此類藥用於治療非胰島素依賴型或成人型或第二型糖尿病，它可增加胰島素受體的敏感度，進而降低血糖。
<input type="checkbox"/> Glucomine F.C. <input type="checkbox"/> 其他_____	此類藥用於治療非胰島素依賴型或成人型或第二型糖尿病，它可降低肝醣合成、降低腸道糖分的吸收及提高胰島素的感受性，而產生降低血糖的作用。
<input type="checkbox"/> NovoNorm <input type="checkbox"/> Starlix <input type="checkbox"/> 其他_____	治療非胰島素依賴型或成人型或第二型糖尿病，它可刺激胰臟分泌胰島素，而降低血糖。
<input type="checkbox"/> glucobay <input type="checkbox"/> 其他_____	抑制碳水化合物再腸道吸收，延遲胃排空、抑制食慾，促進β細胞隊葡萄糖的敏感性而改善胰島素的釋放，改善飯後血糖
<input type="checkbox"/> Actos <input type="checkbox"/> Avandia F.C <input type="checkbox"/> 其他_____	強胰島素周邊及肝臟作用，使用時應注意 GOT、GPT 指數，上升道正常值 2.5 倍時應停用

日期/指導者	病人/家屬 簽名	成效評值	日期/評值者	再次評值	日期/評值者

成效評值：1.瞭解 2.部份瞭解 3.不瞭解 (部份瞭解/不瞭解 請再次評值)

編號： YR-ND-N-0308

◎注意事項：

1. 依藥物作用時間、醫囑於飯前 15-30 分鐘服藥或服藥後立即用餐(半小時內請務必進食)。倘若未打算進食，請不要服用藥物。
2. 請固定每日同一時間服用藥物。若忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍量。
3. 如有高血糖症狀(極度口渴、多尿、尿糖)應告知醫師，以調整劑量或飲食。
4. 經常監測血糖值，並注意低血糖症狀。
5. 低血糖的症狀：感覺饑餓、虛弱、冒冷汗、顫抖、頭痛、混亂、頭暈、發冷、心跳加速、無法集中注意力。此時應立即進食含糖飲料或食物，如：果汁、糖水、方糖，並告知醫護人員或立即至醫院就診。嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，不可進食，需立即送急診。
6. 可能的副作用：腸胃刺激(噁心、嘔吐、腹瀉)、頭痛、低血糖、過敏(皮膚發疹及發癢)，偶有水腫或輕度肝炎。
7. 使用口服藥一段時間之後，須與醫師討論使用情形，由醫師決定是否需改用胰島素。
8. 有嚴重感染、發燒、嚴重外傷、手術等重大壓力情況時，可能血糖暫時失控而須改用胰島素，須與醫師討論使用情形。

員榮綜合醫院關心您！

請黏貼於病歷

口服降血糖藥物指導

◎注意事項：

1.依醫囑於飯前 15-30 分鐘服藥或服藥後立即用餐(半小時內請務必進食)。倘若未打算進食，請不要服用藥物。2.請固定每日同一時間服用藥物。若忘記服藥，儘快補服；若已接近下次服藥時間，就不必補服，切記不可服用兩倍量。3.如有高血糖症狀(極度口渴、多尿、尿糖)應告知醫師，以調整劑量或飲食。4.經常監測血糖值，並注意低血糖症狀。5.低血糖的症狀：感覺饑餓、虛弱、冒冷汗、顫抖、頭痛、混亂、頭暈、發冷、心跳加速、無法集中注意。此時應立即進食含糖飲料或食物，如果汁、糖水、方糖。如未見改善，則應送急診。嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，不可進食，需立即送急診。6.可能的副作用：腸胃刺激(噁心、嘔吐、腹瀉)、頭痛、低血糖、過敏(皮膚發疹及發癢)，偶有水腫或輕度肝炎。7.使用口服藥一段時間之後，須與醫師討論使用情形，由醫師決定是否需改用胰島素。8.有嚴重感染、發燒、嚴重外傷、手術等重大壓力情況時，可能血糖暫時失控而須改用胰島素，須與醫師討論使用情形。9.服藥期間，可能會對陽光特別敏感，儘量避免直接日曬，並做好防曬措施。