

降血脂藥物指導

編號：YR-ND-N-0305

藥品名稱	作用
<input type="checkbox"/> Crostor <input type="checkbox"/> Zolotin <input type="checkbox"/> Lescol <input type="checkbox"/> Lescol <input type="checkbox"/> Lipitor <input type="checkbox"/> Lipanthyl <input type="checkbox"/> Atorin <input type="checkbox"/> Caduet <input type="checkbox"/> Vytorin <input type="checkbox"/> 其他_____	此類藥物可降低體內三酸甘油酯值、總膽固醇值、極低密度脂蛋白(VLDL)、低密度脂蛋白(LDL)及增加高密度脂蛋白(HDL)。用於治療高脂質血症(可降低罹患冠狀動脈心臟病的危險性)。

◎注意事項：

1. 可能的副作用：胃腸道（噁心、嘔吐、腹痛、口乾、便秘、腹瀉及脹氣）、頭痛、暈眩、失眠、降低性慾、皮疹、肝臟指數短暫上升。
2. 如有下列情形發生，請立即通知醫師：肌肉疼痛或壓痛、無力、嚴重腹痛、噁心、嘔吐、不明原因的發燒、過敏反應(搔癢或蕁麻疹、臉部或手部水腫、嘴部或喉嚨水腫、胸悶或呼吸困難)、水泡、脫皮及皮膚紅疹，眼睛或皮膚變黃，尿液變深或糞便顏色變白。
3. 葡萄柚汁會增加這類藥物血中濃度，應避免併服。
4. 除藥物以外，最好能合併飲食控制、運動及體重控制，方可有效的降低及維持三酸甘油酯及膽固醇值在正常範圍內。
5. 服用此類藥物期間請勿喝酒。
6. 此類藥物可能會使皮膚對日曬敏感，避免不必要的日曬或降低日曬的時間，並作好防曬措施（著長袖、太陽眼鏡、防曬油）。
7. 若有過敏、糖尿病、肝腎疾病、甲狀腺機能異常、膽囊疾病(膽結石、膽管阻塞等)、肌肉疾病、飲用大量酒精類飲料、孕婦、計畫懷孕或授乳婦女，請於開始服藥前告知醫師。
8. 此上藥物最好於下午(5點)以後服用效果會比較好。

員榮醫院關心您！

請交病人參閱

請黏貼於病歷

降血脂藥物指導

藥品名稱	作用
<input type="checkbox"/> Crostor <input type="checkbox"/> Zolotin <input type="checkbox"/> Lipitor <input type="checkbox"/> Lescol <input type="checkbox"/> Lescol <input type="checkbox"/> Caduet <input type="checkbox"/> Vytorin <input type="checkbox"/> 其他_____	此類藥物可降低體內三酸甘油酯值、總膽固醇值、極低密度脂蛋白(VLDL)、低密度脂蛋白(LDL)及增加高密度脂蛋白(HDL)。用於治療高脂質血症(可降低罹患冠狀動脈心臟病的危險性)。

9. ◎**注意事項**：1. 可能的副作用：胃腸道（噁心、嘔吐、腹痛、口乾、便秘、腹瀉及脹氣）、頭痛、暈眩、失眠、降低性慾、皮疹、肝臟指數短暫上升。2. 如有下列情形發生，請立即通知醫師：肌肉疼痛或壓痛、無力、嚴重腹痛、噁心、嘔吐、不明原因的發燒、過敏反應(搔癢或蕁麻疹、臉部或手部水腫、嘴部或喉嚨水腫、胸悶或呼吸困難)、水泡、脫皮及皮膚紅疹，眼睛或皮膚變黃，尿液變深或糞便顏色變白。3. 葡萄柚汁會增加這類藥物血中濃度，應避免併服。4. 除藥物以外，最好能合併飲食控制、運動及體重控制，方可有效的降低及維持三酸甘油酯及膽固醇值在正常範圍內。5. 服用此類藥物期間請勿喝酒。6. 此類藥物可能會使皮膚對日曬敏感，避免不必要的日曬或降低日曬的時間，並作好防曬措施（著長袖、太陽眼鏡、防曬油）。7. 若有過敏、糖尿病、肝腎疾病、甲狀腺機能異常、膽囊疾病(膽結石、膽管阻塞等)、肌肉疾病、飲用大量酒精類飲料、孕婦、計畫懷孕或授乳婦女，請於開始服藥前告知醫師。8. 此上藥物最好於下午(5點)以後服用效果會比較好。

日期/指導者	病人/家屬 簽名	成效評值	日期/評值者	再次評值	日期/評值者

成效評值：1.瞭解 2.部份瞭解 3.不瞭解 (部份瞭解/不瞭解 請再次評值)

編號：YR-ND-N-0305